

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 11/23 di **Fiorello Terzariol** del 29 Giugno 2023

VITE: MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE AMPELOPATIE: PERONOSPORA/OIDIO e INSETTI FITOFAGI.

Dopo le continue piovosità soprattutto serali della prima quindicina di giugno, l'ultimo periodo meteorologico è stato caratterizzato da assenza di piogge e da un andamento termico tra i 24 e i 26°C di media.

Le fasi fenologiche si susseguono piuttosto velocemente, con lo Chardonnay e i Pinot in chiusura del grappolo e la Glera che varia da grano di pepe ad acini a pisello.

La **Peronospora** sta riprendendosi tutto ciò che aveva lasciato negli ultimi anni, con un riscontro piuttosto preoccupante del fungo nel territorio, in particolare nella conduzione biologica, ma anche in quella convenzionale, per il momento nella forma palese, in attesa della scontata, a breve, forma larvata (negron).

Le piovosità attorno ai 15 mm di martedì 27 giugno e quelle in attesa a fine mese, potrebbero creare un ulteriore potenziale stimolo sullo sviluppo dell'inoculo peronosporico in una fase molto delicata come quella attuale.

Continuare quindi a tenere alta l'attenzione nella difesa (vedi anche le deroghe concesse dalla Regione Veneto con la possibilità di ulteriori due interventi nelle LTDI VITE 2023 con sostanze CMR a base di **Folpet** o **Dithianon** o **Fluazinam**), senza allungare gli intervalli riportati dai prodotti fitosanitari impiegati e da impiegare!

Nei prossimi interventi **antiperonosporici**, si potranno utilizzare ancora prodotti endoterapici in particolare ad attività **Citotropica** (abbinati alle sostanze attive sopradescritte), o impiegare sostanze ad azione "cerodinamica", tipo: **Zoxamide**, **Amisulbrom**, **Ametoctradin**, **Mandipropamide**, **Ciazofamide...** (attenzione all'intervallo e al numero massimo di impiego indicato nell'etichetta dei singoli prodotti commerciali!).

Intervenire quanto prima con il prodotto **Rameico**, in occasione di **grandinate** o **forti piovosità** (come puntualmente si verificano in questa stagione!).

Attenzione agli eventuali focolai di **Oidio**, che possono essere favoriti dall'attuale andamento meteo caldo-umido. In tali casi intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta, o con antioidici di pari durata degli antiperonosporici utilizzati.

TIGNOLE DELLA VITE (seconda generazione)

Sono iniziati attorno alla fine della seconda decade di giugno i voli delle **Tignole** di seconda generazione. Contro questi lepidotteri, oltre ai **Regolatori di crescita**, tipo il **Metossifenozone** e il **Tebufenozide** da posizionare sempre dopo aver falciato l'erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi (tra cui le api), si possono impiegare anche la **Chlorantraniliprole** e l'**Emamectina benzoato**, oppure lo **Spinetoram** indicativamente da fine giugno ai primi di luglio (verificare comunque le indicazioni specifiche riportate dai bollettini zionali...che diversificano di qualche giorno dalla pianura alla collina). Posizionare il trattamento nella fascia dei grappoli; a differenza degli interventi contro le cicaline che devono interessare completamente tutta la massa vegetativa, quindi con abbondante acqua.

Aziende ad indirizzo **BIOLOGICO** (Reg. CE n. 834 del 28 giugno 2007): per coloro che solitamente utilizzano lo **Spinosad** o il **Bacillus thuringiensis** contro le **Tignole**, si indica un primo intervento attorno al **2-4 luglio**, da ripetere a 7-8 giorni.

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Nella lotta alla **Flavescenza dorata** e al suo insetto vettore SCAPHOIDEUS Titanus al momento si stanno riscontrando in prevalenza individui di quarta età, con una buona presenza anche della quinta età. Diventa quindi necessario posizionare al più presto le trappole cromotropiche per il monitoraggio delle prime forme adulte dell'insetto.

Si ricorda che il **secondo** trattamento insetticida obbligatorio nel convenzionale (zona infestata) deve essere effettuato tra il **27 giugno** e il **7 luglio** con prodotti **Piretroidi** e comunque a distanza indicativa di una decina di giorni dal primo intervento obbligatorio impiegato.

Si raccomanda almeno di **CAPITIZZARE** al più presto le piante sintomatiche da FD, per intervenire quanto prima con l'**ESTIRPO!!!**



Una pratica assolutamente da **NON** fare (capitizzare lasciando un pollone e i successivi ricacci)

Attenzione ai **DIVIETI** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale (sono state concesse delle **DEROGHE** sull'impiego di alcuni insetticidi nell'area della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco) e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli, e alle limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che hanno aderito a tale certificazione. Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **ETICHETTE** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.