

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 12/20 di **Fiorello Terzariol** del 23 Giugno 2020

## VITE: SEMPRE ELEVATA L'ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE AMPELOPATIE: FUNGHI e INSETTI FITOFAGI.

Dopo le prime due decadi di giugno caratterizzate da continue e abbondanti piovosità con alcune anche devastanti grandinate, l'ultima decade del mese è iniziata con il segno del bel tempo e con previsioni di contenuta variabilità!

Continuano a sovrapporsi le varie fasi fenologiche, con un ragguardevole accrescimento degli acini e dei grappoli.

Nei testimoni non trattati cominciano ad essere elevati e anche "esplosivi" i riscontri della **Peronospora** mentre, per il momento, sono ancora marginali le presenze del fungo peronosporico nei vigneti normalmente trattati (in realtà quando è stato possibile), anche se potenzialmente un "colpo di coda" della larvata (negrone) potrebbe manifestarsi più avanti.

Continuare comunque a tenere alta l'attenzione nella difesa, senza allungare gli intervalli riportati dai prodotti fitosanitari impiegati e da impiegare!

Il prossimo trattamento antiperonosporico viene indicato con l'utilizzo di prodotti **Rameici**, abbinati ancora una volta alle sostanze attive ad azione **Cerodinamica...**(attenzione al numero massimo di impiego indicato nell'etichetta dei singoli prodotti commerciali fin qui utilizzati!).

Intervenire quanto prima con il prodotto **Rameico**, in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Attenzione agli eventuali focolai di **Oidio**, che possono essere favoriti dall'attuale andamento meteo caldo-umido. In tali casi intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta, o con antioidici di pari durata degli antiperonosporici utilizzati.

## TIGNOLE DELLA VITE (seconda generazione) e Flavescenza dorata.

Sono iniziati verso la fine della seconda decade di giugno i voli delle **Tignole** di seconda generazione. Contro questi lepidotteri, oltre ai **Regolatori di crescita**, tipo il **Metossifenozone** e il **Tebufenozide** da posizionare sempre dopo aver falciato l'erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi (tra cui le api), si possono impiegare anche la **Chlorantraniliprole** e l'**Emamectina benzoato** attorno al **26-30 giugno**.

In alternativa, tra il **29 giugno** e il **3 luglio**, si potrà utilizzare lo **Spinetoram**.

**Aziende ad indirizzo BIOLOGICO** (Reg. CE n. 834 del 28 giugno 2007): per coloro che solitamente utilizzano lo **Spinosad** o il **Bacillus thuringiensis** contro le **Tignole**, si indica un primo intervento attorno al **25 giugno**, da ripetere a 7-9 giorni. Nella lotta alla **Flavescenza dorata** contro lo **Scaphoideus titanus** intervenire nella presente settimana (trattando nelle ore tardo serali) con il **Piretro naturale** ...da ripetere a 7 giorni).

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei **Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli**.

CONDIFESATVB

Tutela e sviluppo dell'agricoltura