

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 14/21 di **Fiorello Terzariol** del 1 agosto 2021

CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI DEL MESE DI LUGLIO 2021

Temperatura media: 23,83°C; **Umidità** relativa media dell'aria: 67%;
Piovosità: 66 mm; **Giorni piovosi:** 9!

VITE: ARRIVATA FINALMENTE LA FASE DI INVAIATURA !



Invaiatura del Pinot grigio



Vigneto abbandonato

L'ultimo periodo è stato caratterizzato da un andamento che ha mantenuto una certa variabilità meteorologica, con giornate soleggiate caldo umide, accompagnate però da fenomeni piovosi, a macchia di leopardo, con le puntuali grandinate ed elevata ventosità.

Negli ultimi giorni la fenologia delle diverse cultivar sta evidenziando la fase da **chiusura del grappolo** all'agognata **invaiatura**, con le varietà precoci che si avviano alla maturazione, confermando il ritardo dell'inizio vendemmiale (settembre...), come preventivato nella fase fiorale di quest'anno..

Con la fase di invaiatura si allontana il pericolo di sorprese della **Peronospora** sul grappolo, mentre la presenza del fungo potrà essere ancora evidente sulle ultime foglie e nelle femminelle, anche perché la forma a “mosaico” sulla foglia rappresenta la Peronospora che dovrà accompagnare la specie nei prossimi anni (forma sessuata, quindi molto forte e difficile da eliminare!).

Gli interventi antiperonosporici dovranno proseguire in questo periodo, ma ancora per poco, con i classici prodotti **Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..)**.

Si mantengono in complesso limitati i riscontri dell' **Oidio**, ma in questo caso bisogna intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta.

Come riportato nel bollettino precedente, si consiglia di porre attenzione al pericolo di insorgenza della **Botrite** e di intervenire, soprattutto nelle varietà a grappolo compatto in questa fase di **invaiatura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, con un **antibotritico specifico**, preferibilmente di origine biologica (come indicato nelle linee tecniche della Regione del Veneto).

Questo perché si potranno evitare residui delle sostanze antibotritiche dopo la vinificazione e ottenere anche un miglior controllo in campo del marciume acido.

Riscontri inferiori rispetto allo scorso anno delle viti con le classiche foglie tigrate del **Mal dell'esca**, e del **Black rot** su grappolo.

Si conferma la preoccupante e generalizzata manifestazione da **Flavescenza dorata** (con il vettore *Scaphoideus titanus* ormai solo in forma adulta). Si ricorda l'obbligo di **capitozzare** le piante sintomatiche, con il successivo **estirpo** nel periodo autunno/invernale.

Si raccomanda di non lasciare i vigneti abbandonati (vedi foto), come nei casi dei classici contenziosi parentali, perché possono creare asilo e rifugio alle forme (Scafo infetto) di diffusione della malattia!

Grande attenzione ai tempi di carenza delle sostanze attive da impiegare!!!

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

**Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook...!!**