

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 16/22 di **Fiorello Terzariol** del 27 luglio 2022

VITE: INIZIO INVAIATURA (ATTUALMENTE IN MANIERA DIFFORME) DELLA GLERA. SI MANTENGONO i 10-12 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO al 2021.

L'ultimo periodo meteorologico ha continuato ad evidenziare e mantenere un andamento siccitoso, con valori termici che hanno presentato medie attorno ai 28-30°C, con massime che hanno raggiunto anche i 40 gradi (lunedì 25 luglio)!

La fenologia nelle diverse cultivar presenta la **chiusura del grappolo** e la fase dell'**invaiaura** nelle varietà a maturazione precoce (Pinot e Chardonnay).

Riscontri di grappoli di Merlot e di Glera che invaiano.

Si cominciano a pianificare gli ultimi trattamenti antiperonosporici a seconda delle cultivar, se a maturazione precoce o tardiva. Comunque, saranno ancora i classici prodotti **Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..)** ad accompagnare i trattamenti contro la **Peronospora** in questo ultimo periodo di difesa (difficoltà di riscontrare, come solitamente invece accade in questo periodo, il fungo (forma a mosaico) nelle ultime foglie e nelle femminelle!

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale...), in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Con eventuali focolai di **Oidio** intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato**.

Attenzione ad un eventuale repentino cambio meteorologico. Nel caso di "continue" ed "elevate" piovosità (da tutti auspiccate...) si corre il rischio di un veloce assorbimento idrico da parte della pianta, con aumento immediato del volume dell'acino e con possibilità di rottura della buccia.

Per tale motivo (trattamenti sempre preventivi...), contro la **Botrite** e soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di **invaiaura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica (come indicato nelle linee tecniche della Regione del Veneto). Questo perché si evitano residui nel vino e si ottiene anche un miglior controllo del marciume acido.

Puntuale esplosione del **Mal dell'esca**; limitate segnalazioni del **Black rot** su grappolo; aumento delle presenze in particolare di **Ragnetto giallo e rosso** (come dovevamo attenderci dopo gli impieghi dei Piretroidi) e della **Cocciniglia**. Ovviamente si confermano le preoccupanti manifestazioni della **Flavescenza dorata** (...si ricorda l'obbligo di **estirpare** le piante sintomatiche) e del riscontro, ancora numericamente preoccupante in alcuni ambienti viticoli, degli adulti di **Scaphoideus titanus** nelle trappole cromotropiche.

E' imminente l'inizio dei voli delle **Tignole** di terza generazione.

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

Attenzione ai periodi di carenza dei prodotti fitosanitari da impiegare!



Glera in invaiatura e in chiusura del grappolo nello stesso vigneto (foto del 25 luglio 2022)



Lotta alla Flavescenza dorata: interventi di estirpo e di capitozzatura



Stress da siccità



Vite con sintomi da FD e Mal dell'esca