

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 02/24 di Fiorello Terzariol

Inviato il 14/04/2024

VITE: INDICAZIONI PER IL PRIMO TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO CAUTELATIVO

Meteorologia: prima metà di aprile con temperature in continuo aumento, con valori medi che dai 12°C del primo aprile hanno superato i 21 gradi negli ultimi giorni. Precipitazioni piuttosto importanti nella parte finale di marzo e la prima giornata di aprile, successivamente fenomeni molto marginali.

La **fenologia**, con l'innalzamento termico nell'ultimo periodo e la riserva idrica accumulata dall'inizio dell'anno, ha evidenziato una accelerata in particolare nella Glera, mantenendo però una elevata difformità nei diversi ambienti viticoli, all'interno della stessa area e per la stessa varietà (vedi foto del 14 aprile): da germogli di oltre 30 cm con grappolini separati (foto A), a germogli attorno ai 5 cm (foto B).

Inizio vegetativo per il Pinot grigio (foto C del 12 aprile).

Nella **difesa antiperonosporica** l'attenzione viene posta in particolare sulla previsione di un evento piovoso atteso nella giornata di martedì 16 aprile. In questo caso potrebbe essere preso in considerazione un intervento antiperonosporico cautelativo a ridosso (**prima**) della piovosità prevista e solo in presenza degli stadi fenologici potenzialmente recettivi al fungo (in particolare della **foto A**). Comunque, **non** si consiglia assolutamente di trattare subito dopo la pioggia (un classico), nel caso si parli di intervento contro una potenziale infezione primaria!!!

Per questa eventualità (intervento dopo la pioggia) si ricorda, ancora una volta, che necessita intervenire con l'antiperonosporico dopo aver calcolato l'ipotetica incubazione del fungo nei giorni successivi all'evento piovoso, determinato dall'andamento termico di quei giorni e che potranno determinare una attesa di 5-6 giorni (...calo termico del 17 e 18 aprile), proiettando l'antiperonosporico attorno alla giornata di lunedì 22 aprile (saremo più precisi nel prossimo bollettino...promesso!), con prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo: **Metiram**, **Ditianon**, **Fluazinam**, **Folpet** e naturalmente **Rameici**.

Comunque, un primo assaggio di POMPA/SPRINGA DAY si è avuto puntualmente nella giornata di sabato 13 aprile (per alcuni addirittura al secondo intervento antiperonosporico!!!), determinato dai soliti "suggerimenti territoriali" derivati dalle consuete elaborazioni emesse dagli algoritmi altamente cautelativi dei supporti decisionali, che però devono essere tradotti ed eventualmente applicati dopo la fondamentale interpretazione dei "TECNICI" !!!.

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, possono intervenire già in questa fase che inizia ad essere, di elevata attività fisiologica e di allungamento vegetativo, coadiuvando tali sostanze ai prodotti sopra indicati (attenzione alla fitotossicità che possono provocare miscele estemporanee "fatte in casa" tra il fosetil/fosfonati e il rame!).

Abbinare all'antiperonosporico lo **Zolfo micronizzato** per il controllo preventivo dell'**Oidio**.

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni!

Glera stessa località (Collalbrigo di Conegliano) al 22.04.2023 e 14 aprile 2024



Foto A (m.200 s.l.m.)



Foto B (m.100 s.l.m.)



Foto C (Pinot grigio al 26.04.2023 e 12 aprile 2024)

