

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 3/23 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 05.05.2023

CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI (Treviso) MESE DI APRILE 2023

Temperatura media: **12,2°C** (-0,4°C sulla media); Umidità relativa media dell'aria: **71%**;
Piovosità: **56** mm (-40 mm sulla media); Giorni piovosi: **9** (totale dall'inizio dell'anno 24 giorni!).

VITE: IL PERDURARE DELLA VARIABILITA' METEO INIZIA A CREARE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERONOSPORA!

Le piogge verificatesi tra il 24 e il 25 di aprile e riprese all'inizio di maggio, a seconda dei riscontri vegetativi del momento (almeno con germogli di 10 cm), possono aver confermato l'inizio di potenziali infezioni primarie della **Peronospora 2023**, che si potranno compiere (con le ultime piogge dell'1 e 2 maggio) verso la fine della prima decade di maggio!

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico (viste anche le previsioni di possibili prossime perturbazioni) e riposizionare le sostanze con linee di difesa di **Superficie: Metiram, Folpet, Fluazinam, Ditanon, Rameici.**, **entro** l'inizio della seconda settimana di maggio (8/05). Rimangono ora gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione alle piogge dilavanti (ripristinare al più presto il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, possono ovviamente continuare nel loro impiego, in particolare in questa fase fenologica che, con l'innalzamento termico, determinerà un aumento dell'attività fisiologica che favorirà il circolo di tali sostanze, aumentando l'attività fungicida all'interno della pianta.

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici lo **Zolfo micronizzato**.

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere già da ora le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili patologie.

Puntuali le manifestazioni degli ingiallimenti fogliari, tipici nell'accrescimento dei germogli con temperature contenute. Comparsa anche delle prime manifestazioni da "**Virosi del Pinot grigio**" e dell'**Erinosi**.

Da evidenziare anche i primi riscontri di viti sintomatiche da **Flavescenza dorata**. Si ricorda l'obbligo di intervenire con l'immediato estirpo di tali piante, per limitare il pericolo di diffusione della malattia, che prossimamente sarà ancora favorita dalla cicalina *Scaphoideus titanus*. A breve il Decreto/Ordinanza di Lotta Obbligatoria alla malattia!

Nel frattempo si stanno monitorando i voli della prima generazione delle **Tignole** (in particolare la **Tignoletta**) della vite, per determinare gli eventuali primi interventi insetticidi contro questi lepidotteri fitofagi.

Si continua a seguire anche l'evoluzione della **Cocciniglia** (in primis la Cocciniglia farinosa). Per coloro che adottano la difesa biologica con il lancio degli insetti utili si consiglia di intervenire attorno alla metà del mese di maggio.

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti del singolo prodotto).