

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 3/24 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 21.04.2024

VITE: IL PERDURARE DI UNA ELEVATA VARIABILITA' METEOROLOGICA CON TEMPERATURE PIUTTOSTO CONTENUTE HA ALLUNGATO L'INCUBAZIONE DELLA PRIMA IPOTETICA INFEZIONE PERONOSPORICA 2024!

La pioggia (e qualche grandinata) verificatasi nel pomeriggio del 16 aprile (con qualche altra piovosità nei giorni successivi) può aver determinato, a seconda dei riscontri vegetativi di quel momento (almeno con germogli di 10 cm), l'inizio di potenziali infezioni primarie della **Peronospora 2024**, che si potranno compiere (visto il protrarsi delle condizioni termiche molto basse, attorno ai 10°C di media, con valori appena sopra lo zero nella mattinata di venerdì 19!) verso gli ultimi giorni di aprile (allungando il periodo di incubazione di alcuni giorni a quanto era possibile prevedere nel precedente bollettino!).

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico (viste anche le previsioni di possibili prossime perturbazioni) e posizionare le sostanze con linee di difesa di **Superficie: Metiram, Folpet, Fluazinam, Ditanon, Rameici..**, tra **venerdì 26 e sabato 27 aprile** (ripristinare al più presto il trattamento nel caso di dilavamento, cambiando il prodotto commerciale!).

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, possono continuare nel loro impiego, in particolare in questa fase che mantiene condizioni meteo avverse, sperando anche in un prossimo innalzamento termico che stimoli una maggiore circolazione linfatica.

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici lo **Zolfo micronizzato**.

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere già da ora le linee di difesa antiperonosporica e antioidica, adatte prossimamente per contrastare tali possibili patologie.

Puntuali le manifestazioni degli ingiallimenti fogliari, tipici nell'accrescimento dei germogli con temperature contenute. Comparsa anche delle prime manifestazioni da **"Virosi del Pinot grigio"** e dell'**Erinosi**.

Nel frattempo si sta monitorando e riscontrando un aumento dei voli della prima generazione delle **Tignole** (in particolare la **Tignoletta**) della vite.

Si continua a seguire anche l'evoluzione della **Cocciniglia** (in primis la Cocciniglia farinosa). Per coloro che adottano la tecnica della confusione sessuale si consiglia di posizionare gli erogatori di feromoni entro la fine del mese (ovviamente prima dell'inizio dei voli dei maschi adulti).

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.