

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 04/21 di Fiorello Terzariol

Inviato il 03/05/2021

CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI MESE DI APRILE 2021

Temperatura media: **11,13**°C (-1,35°C sulla media); Umidità relativa media dell'aria: **67**%;
Piovosità: **157** mm (+62 mm sulla media); Giorni piovosi: **7** (totale dall'inizio dell'anno 25 giorni!).

VITE: INDICAZIONI PER IL PRIMO TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO CAUTELATIVO

Elevata variabilità **meteorologica** si è evidenziata a partire dagli ultimi giorni di aprile, dopo le consistenti piovosità dell'inizio della seconda decade dello stesso mese. Le condizioni termiche si sono mantenute molto basse (4 – 12°C di media) dal giorno di Pasqua al 22 aprile, con un timido innalzamento delle temperature verso gli ultimi giorni di aprile (13 – 16°C di media).

La **fenologia** ha continuato ad evidenziare una elevatissima difformità all'interno della stessa area viticola e per la stessa varietà (vedi foto del primo maggio), da germogli di oltre 30 cm con grappolini separati, a gemme aperte.

Nella difesa antiperonosporica tutti i riferimenti appena descritti possono porre l'attenzione nei confronti dei fenomeni piovosi, di una certa intensità, iniziati dal pomeriggio del 29 aprile, con situazioni fenologiche potenzialmente recettive al fungo (indubbiamente **foto A**, e marginalmente anche **foto B**), che determinano una particolare attenzione per pianificare il **primo trattamento antiperonosporico cautelativo**, per coloro che non sono intervenuti a ridosso delle piogge iniziate dal 29 (indicate in particolare per le aziende biologiche), attorno alla giornata di **giovedì 6 maggio** con prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo: **Metiram**, **Mancozeb**, **Ditianon**, **Fluazinam**, **Folpet** e naturalmente **Rameici**. Si sottolinea che la **foto C** e **foto D** evidenziano invece le situazioni fenologiche per cui non necessita questo primo trattamento, in quanto non presenti ancora le aperture stomatiche recettive al fungo della Peronospora in occasione delle piogge suddette anche se, nella realtà, i primi "febbricitanti" trattamenti antiperonosporici sono già stati eseguiti a "carattere generale" nella mattinata di sabato 1 e lunedì 3 maggio (il solito pompa/springa day)!!!

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, possono intervenire già in questa fase che inizia ad essere (dopo il periodo con basse condizioni termiche), di elevata attività fisiologica e accrescimento vegetativo, abbinando tali sostanze ai prodotti sopra indicati (attenzione alla fitotossicità che possono provocare miscele estemporanee "fatte in casa" tra il fosetil/fosfonati e il rame!).

Abbinare all'antiperonosporico lo **Zolfo micronizzato** per il controllo preventivo dell'**Oidio**.

D'ora in poi ripristinare quanto prima la copertura in caso di elevate piovosità dopo il trattamento indicato.

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni!

Glera stessa località al primo maggio



Foto A



Foto B



Foto C



Foto D

