AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 – 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 4/23 di **Fiorello Terzariol** **Inviato l'11.05.2023**

VITE: PRIMI MARGINALI RISCONTRI DELLE INFEZIONI PRIMARIE DELLA PERONOSPORA (Plasmopara viticola).

Dopo l'innalzamento termico e di bel tempo che ha caratterizzato la seconda parte della prima settimana di maggio, si evidenzia un repentino cambio delle condizioni meteorologiche con un andamento piovoso e di basse temperature che si protrarrà fino alla metà del mese, causando una elevata e importante attenzione nei confronti delle potenziali malattie fungine, che potranno essere favorite dal prolungarsi di queste condizioni avverse.

Le fasi fenologiche stanno proseguendo nel loro cammino, anche se frenate dai fenomeni meteo sopradescritti, con presenza dei grappoli, nelle fasi più avanzate, di evidente allungamento del rachide.

A questo punto e in questa fase, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico, anche sulla base dei primi riscontri delle macchie derivate dalle prime infezioni nate con le piovosità d'inizio maggio, e sfruttare al meglio le opportunità date dai prodotti ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica** (con partner di contatto!), intervenendo tempestivamente in occasione di una "finestra" senza pioggia, con sostanze tipo: **Dimetomorf**, **Mandipropamide, Benalaxil-M Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Valifenalate,** ecc., o continuando con il **Fosetil di alluminio**…o con i **Fosfonati** (**potassio** e **disodio**).

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E.** (nuova sostanza **Mefentrifluconazolo**), **Metrafenone**, **Spiroxamina**, **Pyriofenone**, **Cyflufenamide**, **Trifloxystrobin, Fluxapyroxad, ecc.**

.

Per le aziende che continuano ad operare solo con linee di difesa **antiperonosporica** di **Superficie**: **Metiram**, Folpet, Fluazinam, Ditianon, **Rameici..** con quest'ultimi, in particolare nella difesa biologica, si consiglia di abbinare l'**Olio essenziale di arancio dolce**, o le **Cerevisane** (questi con azione anche antioidica), rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione alle piogge dilavanti (ripristinare al più presto il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!

In questo caso la difesa **antioidica** potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato**.

Sono già stati rilevati i massimi voli delle **Tignole** (gran parte **Tignolette** in realtà) **di prima generazione**. Per coloro che mirano al controllo di questi lepidotteri si consiglia di intervenire (indicativamente dalla seconda metà di maggio e solo dopo aver falciato l'erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi, tra cui le api), nelle varietà più sensibili e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con gli insetticidi più idonei a seconda della loro attività (dagli ovicidi alla presenza delle larvette).

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili patologie.

Primi sintomi di Flavescenza dorata 2023

Virosi del Pinot grigio

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti e le dosi del singolo prodotto).

CondifesaTVB
Tutela e sviluppo dell'agricoltura