

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO  
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità  
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)  
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 5/21 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 12.05.2021

## VITE: L'ELEVATA VARIABILITA' METEO CREA MAGGIORE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERONOSPORA e MANTIENE UN RITARDO FENOLOGICO ATTORNO ALLE DUE SETTIMANE!

Le piogge verificatesi a cavallo tra fine aprile e i primi di maggio possono aver dato inizio a diverse potenziali infezioni primarie della **Peronospora** 2021, che si stanno compiendo in questi giorni tra la fine della prima decade, alla metà del mese di maggio!

In **copertina**: **primo riscontro del fungo** (muffetta bianca data dai rami conidiofori nella pagina inferiore della foglia), oggi 12 maggio su Glera a Ponte di Piave, da Elisa Barbisan.

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico, e sfruttare al meglio le opportunità date dai prodotti (tanti...!) ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica** (con partner di contatto!) intervenendo appena possibile (visto il perdurare del maltempo); oppure con sostanze ad attività **sistemica** tipo: **Metalaxil-M**, **Benalaxil** (ultimo anno d'impiego), **Benalaxil-M**, **Oxathiapiprolin**, **Cyazofamid** (preferibile comunque utilizzare questi prodotti a ridosso della fioritura); in questa fase invece **Fosetil di alluminio**...o **Fosfonati** (**potassio** e **disodio**).

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E.**, **Metrafenone**, **Spiroxamina**, **Pyriofenone**, **Cyflufenamide**, **Trifloxystrobin**, **Fluxapyroxad**, ecc.

Per le aziende che continuano ad operare solo con linee di difesa **antiperonosporica** di **Superficie**: **Metiram**, **Mancozeb Folpet**, **Fluazinam**, **Ditianon**, **Rameici..** e con quest'ultimi, nella difesa biologica si consiglia di abbinare l'**Olio essenziale di arancio dolce**, o le **Cerevisane** (questi con azione anche antioidica), rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione alle piogge dilavanti (ripristinare il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!

In questo caso la difesa **antioidica** potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato**.

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili patologie.

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti del singolo prodotto).